



DEO OPTIMO MAX.

UNI ET TRINO,

VIRGINI DEI-PARÆ ET S. LUÇÆ,

Orthodoxorum Medicorum Patrono.

BIU Santé
Médecine
Paris

QUÆSTIO MEDICA*,

QUOD LIBETARIIS DISPUTATIONIBUS

manè discutienda, in Scholis Medicorum, die Jovis secundâ mensis
Decembris, anno Domini M, DCC. LXXXIV,

M. JOANNE-JOSEPHO GILLES, Doctore Medico, Præside.

An Senium à fibrarum rigiditate?

I.

QUÆ innumeris propè & delicatioribus machinis conflata fuit machina, æternùm durare nec debuit, nec potuit. Certas passa mutationes, labitur sensim, deseritur, & frustra quis ab eâ motus repeteret, quos antea tam miro exerceri ordine deprehendebat : ampliùs moveri nescia, ultimum sui tandèm patitur detrimentum. Ejusmodi indolis & naturæ est humanum corpus, seu im-mensa illa solidorum & fluidorum compages, quâ constamus. Hanc mirari & obstupescere satius quàm describere, judicamus. Flexilis initio, tenerrima, incre-menti capax & detrimenti, prima duo durationis suæ exercet tyrocinia,

* Authore M^o VIEILLARD. 1739.

nutritur, vegetat, crescit, donec incrementi sui ἀμύν ἀδεpta, suo quasi præludat victima funeri. Vix enim quis ætatis hujuscæ volatilis cœpit degustare delicias, ut citò mutari omnia, labascere, & ruere in pejus animadvertit. Vanescit hilaris & expeditus corporis habitus, adest molesta & tarda sese movendi difficultas. Vukus olim lævis, purpureisque distinctus coloribus, jam livescit, rugis inficitur. Videas igne non indecoro lascivientes nuper oculos tenebricosâ obvolutos caligine; quæ olim membra avidè luxuriabant, en feriare amant & quiescere. Pluunt è capite capilli, aut si ipsis, sæva minùs, fati necessitas aliquandò pepercerit, posito quem à naturâ acceperant, colore, canitiem induunt; claram vocem & sonoram fugat malè distincta vox & tremula. Quæ jucundè & alacriter exercebantur corporis functiones, nonnisi difficulter fiunt. Ruunt affatim oblectamenti cujuscunque fastidium, magna & inordinata garriendi prurigo, frequentior idearum infantilium caterva, gravissima præteritorum obliteratio, tussis importuna, vix ulli ferenda sputatio, respiratio difficilis, cita, anhelosa. Enumerabo innumera alia morborum genera, quæ in senectutem, tanquam ex jugi fonte emanare, non sinè summo doloris sensu videntur? Tantorum causam malorum quæris anxius? Desine hanc ulterius scrutari. Attende ad ea quæ in corpore singulis ætatibus geruntur, tumque in omnibus aliis liberum esse liquoribus per vasa transitum videris, dùm ipsis in senio tam desideratum hoc iter occluditur.

I I.

PERSEVERANTE æquabili, fluidorum per vasa motu & impetu, horumque debito in illa renixu, stat perfecta sanitas. Læso alterutro jam morbus ingruit; undè, quâ proportionè hoc vel illud magis læditur, eò gravior morbus. Et quisquam senectutem morborum omnium omninò maximum esse negaverit? Qui quondam à cerebro abundè secernebatur, & uno tenore in totum corporis habitum impellebatur succus nerveus, hujus glandulæ ferè viam oblitus in senio, debitâ sui copiâ corpus privat universum; hinc debilitas summa. Imminutâ vasorum in fluida actione, succi nutritii solitò minùs elaboratur; hinc imminuta, aut potius ferè nulla in extremis nutritio; hinc decrescit musculorum moles, hinc fit cutis laxior, hinc rugis exaratur corpus. Dolemus exules è capite capillos? Hos quoque fugavit nutritimenti defectus. Nempè obturatis vasculis capillorum vasa majora componentibus, hæc brevi obturantur, ita ut ad ipsa usque pervenire lympa nullatenus potest; hinc crines rucere citò necesse est. Neque ita stupendum, rubros olim, albescere. Neminem enim, vel tantillum rebus physiologicis instructum, latet in crinibus vasa duplicis esse generis, lymphatica scilicet & sanguifera. Illa lympham tantummodò, hæc globulos rubros sero innatantes admittunt. Cùm ergo hæc vasa ejusdem naturæ sint ac cætera quæ passim in corpore disseminantur, quis ipsa innumeros efficere gyros & alia ubique aliis intrinsecari diffiteatur? Hinc plures una miscentur colores, qui innumeros alios, prout ille vel ille dominatur, oculis objiciunt. Ubi autem prædictus purpureus latex non sat magnâ vi impellitur ut solitum ingrediatur iter, jam nulla mixtio; cernitur tantùm humor albicans, seu lympa, quæ, utpotè globulis tenuior, minori vi indiget suos ut penetret canaliculos, hinc capillorum albedo. Quid plura de cæteris quæ miseros excruciare senes passim cernimus? Ætatem sanè lacrimis omnibus lugendam, quæ, dùm tristissima est, remoto communi hoc fonte ex quo prædictæ omnes cærumnæ oriuntur, omnium fuisset jucundissima!

FIBRAM cum Boherrhawio concipimus, quid minimum, simplicissimum; moere terrestre, ex quo totum exurgit corpus humanum. Illa si spectetur sola, vix rigiditatis capax est; at aliis juncta similibus fibram paulò majorem efficientibus, ut debilitatem & laxitatem, ita & pari rigiditatem potest. Plures novimus hujusce rigiditatis causas, quas inter eminet nimia nutritio. Hinc eadem causâ labitur & perit fibra, quâ vegetaverat. Mollis initio, facile fluidorum cedit impulsui, elongatur, nutritiæ ipsi particulæ abundè accedunt, roboratur in dies, dum statum, quem *consistentiæ* dicunt, fuerit adepta. Jam non crescit ampliùs, æternumque hoc in statu maneret tuta, si quantum affricu fluidorum ab ipsâ detrahitur, præcisè tantum à nutritione acciperet. At cum non solitò major fiat deperditio, neque fibra in longum aut in profundum crescat ampliùs, perseverante eadem nutrimenti ratione, reliquum est ut in augmentum propriæ substantiæ augeatur. Porro hoc incremento tantillùm robustior facta, fluidis in se impingentibus majus offert obstaculum; hinc humidum particulis fibram constituentibus interpositum premitur magis, & in communem fluidorum alveum secedere cogitur; hinc arescit fibra, major ipsi durities accedit, imminuitur illius resiliendi vis paulò minor in dies abitura, augetur rigiditas, quæ certum adepta terminum, fluidis tandem per vasa negat omninò transitum. Hinc cur varii *decidentiæ* gradus?

IV.

PLURES fibræ majores adunatæ & arctiori intricatu junctæ membranam efficiunt, quæ cavum in orbem contorta, vasculum efficit tenuissimum, vix subtilissimo liquori pervium. Id vasorum genus vasa ultima appellant, jure an injuria? Ex ultimis vasis altera exurgit membrana, quæ iterum circumvoluta vas majus constituit; nequè maxima alio nascuntur modo. Hinc, ut fibra major à minori, sic vasa majora suam à minoribus ducunt originem. At hoc discriminis intercedit, quod elementa fibræ majoris vix ulli sint morbo obnoxia, dum vasa majora, eisdem cum suis principiis patiuntur manes. Porro positâ fibrarum rigiditate, rigescunt vasa ultima, persistente eadem nutritione, vel levissimâ materiæ portione obturabitur illorum tantæ exilitatis diameter, ut ipsam oculorum aciem microscopio armatam effugiat; cito coalescent. Tum rigentibus vasorum majorum parietibus, à fluidis agrè dilatantur, imò non ita dilatantur ac antea, hinc debilior illorum *Elater*; hinc imminuta actio in fluida, quæ, ideo solum in statu sano ad extrema usque vasculorum perveniunt, quod tensa semel vasa propiora, sese restituendo, ipsa validissimè premant, & cogant effluere quâ via panditur. At gradus hic rigiditatis non ita formidandus, ac si vasorum membrana quædam cartilaginum indolem indueret, ut pluries, apud Anatomistas, docuit nos cadáverum inspectio; tunc enim cessat motus omnis, ingruitque mors ineluctabilis.

V.

AT quis arguet; vasa umbilicalia, citò in adultis obliterantur & in ligamentum abeunt, nullo tamen exindè accedente morbo. Cur ergò, aut quomodo pejorem ac alia sortem experiuntur? Hæc ita decrevit ingeniosa parens natura propositos ut assequeretur fines. Nempe quâ parte ad umbilicum accedunt hæc vasa, tenuissima sunt abdominis integumenta, unde minimum irruenti sanguini renixum obtulissent; hinc morbi gravissimi. Alia sunt præterea

vafa quæ prædictorum vices gerunt. Jam verò graviditatis initio, nulla in foetu depræhenduntur offium vestigia, cartilaginea sunt omnia. Accedente partûs tempore, paulatim duriores evadunt prædictæ partes, ita tamen ut in recens natis molles adhuc sint & ad nutum tractabiles. Crescit infantulus; paucissimisque annis elapsis, quæ vix pultis soliditatem adæquabant, tantam affecuta sunt duri-
tiem, ut non nisi difficillimè rumpi possint. Docuit nos etiam *Autopsia apophyses* plurimas in *Epiphyses* temporis lapsu facescere. Norunt omnes ossa innominata in adultis tribus constare partibus, junctis sibi invicem, interpositis cartilaginibus, sic tamen in ætate provectioribus conjunguntur, ut frangi facilius quàm dissociari queant. Quoties vidimus ossa duo innominata, unicum os efficere? Quas mutationes impedito liquidorum per vasa transiui deberi, nemo sapiens diffitebitur. His accuratè perspectis, cum partes aliæ corporis non alterius sint ac ossa, conditionis, cum eodem modo formentur, nutriantur, crescant, cum sit eadem utrobique nutritionis ratio, materies, quis nobiscum non concluderet?

Ergo, Senium à fibrarum rigiditate.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

<i>M. Joannes-Baptista JUMELIN,</i>	<i>M. Antonius-Chaumont SABA- TIER, Regis in Portu Bre- tensi Medicus.</i>	<i>M. Achilles - Guillelmus LE BEGUE DE PRESLE, Eques & Censor Regius.</i>
<i>M. Thomas LE TENNEUR.</i>	<i>M. Ludovicus DESBOIS DE ROCHEFORT, Eques, Scho- larum Professor designatus & Censor Regius.</i>	<i>M. Cæsar COSTE, Censor Re- gius.</i>
<i>M. Felix VICQ-D'AZYR, è Regia Scientiarum Academia, Serenissimi Comitis Atrebatum Consiliarius Medicus, Regii Medicorum Collegii Nanceja- norum Socius Honorarius.</i>	<i>M. Joannes - Franciscus DE LALOUETTE, Eques,</i>	<i>M. Petrus - Joannes - Claudius MAUDUYT DE LA VA- RENNE.</i>

Proponebat Parisiis CAROLUS-NICOLAUS BEAUVAIS DE PRÉAU, Aurelius, Bituricensis Doctor, Aurelianorum Medicorum Collegio Aggregatus, ejusdem Urbis è Regiâ Rei Agrariæ Societate, Regiæque Physices, Historiæ Naturalis & Artium Societatis Secretarius perpetuo ordinarius, Academiarum Divionensis & Rhotomagensis, nec-non Collegii Medicorum Nanceiani Socius, Censor Regius, & Saluberrimæ Facultatis Medicinæ Parisiensis Baccalau-
reus, A. R. S. H. 1784.

AB OCTAVA AD MERIDIEM.

